

Så farliga är medicinerna

<http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13338074.ab>

Anna Alexandersson

Aftonbladet, 17.7.2011



Här är Läkemedelsverkets lista över mediciner med dödliga biverkningar. Förra året riktades misstankarna mot läkemedel vid 93 dödsfall.

Farligast är blodförtunnaren Waran

Varje år får tusentals människor livshotande besvär och ibland men för livet av medicinerna de äter. Det rapporteras också in omkring hundra dödsfall där medicinen kan antas vara boven i dramat. Först på listan ligger Waran. Det löser blodproppar, men orsakar också akuta blödningar.

– När det gäller Waran ser man att det finns ett samband mellan misstanke och dödsfall, säger **Ingemar Persson**, professor vid Läkemedelsverket.

Nästan två procent av svenskarna äter Waran. **Christina Nilsson**, 48, som har en ärftlig risk att få blodproppar och måste äta blodförtunnare livet ut, känner väl till de blå tablettens baksida.

"Ett rättgift"

– Tar man inte Waran har man stor risk att få nya proppar, men samtidigt tvingas många som äter den ta andra mediciner mot biverkningarna.

– Det största problemet är det blå färgämnet i Waran. Jag drabbades av håravfall och hudproblem. Den aktiva substansen gör att man blir lättblödande i mage och tarm och får sura uppstötningar. Det är bokstavligen ett rättgift.

Christina Nilsson, som också är sjuksköterska, har sett de dödliga biverkningarna.

– Jag har haft många patienter på akuten som har förblött. Du kan få ett blödande magsår, feldoserade kan förblöda och råkar du ut för en bilolycka är det större risk att det inte går att stoppa blödningen om du äter Waran.

Barn utsatt grupp

Ingemar Persson konstaterar att patientens bästa livförsäkring är en påläst läkare. Dödliga biverkningar handlar oftast om att patienten har fått fel medicin, fel dos eller fel kombination av läkemedel.

Barn är en annan utsatt grupp. Det ges i dag läkemedel till barn trots att effekten inte är kartlagd, säger han.

– En lag på EU-nivå är på gång att läkemedelsföretagen måste göra undersökningar om hur medicinen fungerar hos barn.

Totalt antal biverkningsrapporter förra året var 5 152. Läkemedelsverket använder rapporterna för att lägga ett komplicerat pussel av orsak och verkan.

– Vi bedömer alltid nyttan mot risken när vi godkänner ett läkemedel.

– I inget fall har biverkningsrapporterna 2010 lett till att man dragit in mediciner, säger Ingemar Persson.

Tre andra fall med personer som blivit svårt sjuka

Man blev blind av fel medicin

En 54-årig Eskilstunabo blev blind på båda ögonen sedan han drabbats av en "grotesk svullnad" i ansiktet. Det tog en vecka och många läkarbesök innan vården drog slutsatsen att det var en allergisk reaktion mot blodtrycksmedicinen. Mannen var då dödssjuk, drabbad av njursvikt och hade köttätande bakterier i ansiktet. Han intensivvårdades i tryckkammare och hud togs bort.

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot vården. Läkaren hade för dålig kunskap.

Kvinna fick hjärnblödning av medicinen

En 77-årig kvinna i Östergötland dog av biverkningen från den blodförtunnande medicinen **Actilyse**. Både kvinnans läkare och Läkemedelsverket drar slutsatsen att medicinen låg bakom dödsfallet.

Fel medicin orsakade svår tarmsjukdom

En Halmstadsbo fick fel medicin efter en operation av halsmandlarna.

Patienten fick tjocktarmsinflammation som utlöste den svåra tarmsjukdomen ulcerös colit.

Den ger livslånga besvär och det finns risk för att få tarmen bortopererad och därmed tvingas ha påse på magen.

Läkemedlen som svenskar dör av

Läkemedelsverket fick förra året in 5 152 rapporter om läkemedelsbiverkningar. I 93 fall misstänktes patientens medicin ha orsakat dödsfall.

Kombinationen av två eller flera läkemedel kan också ge dödliga biverkningar, vilket gör att antalet misstänkta mediciner i listan är fler än antal döda.

I 2 061 rapporter antogs medicinen ha gett allvarliga biverkningar.

Totalt antal biverkningsrapporter och misstänkta läkemedel bakom de 93 dödsfallen:

34: **Waran** – blodförtunnare vid propprisk.

9: **Metformin** – rutinmedicin vid diabetes typ 2.

7: **Plavix** – blodförtunnare.

6: **Trombyl** – mot hjärtkärlsjukdomar.

6: **Actilyse** – (I:Powder) blodförtunnare.

3: **Enalapril** – blodtrycksmedicin.

3: **Fragmin** – blodförtunnare.

3: **Pandemrix** – (Antigen) influensavaccin* (* 6 miljoner vaccinerades i Sverige och inget säkerställt dödsfall, enligt LVM).

2: **Klexane** – förhindrar blodproppar

2: **Cozaar** – mot högt blodtryck/hjärtsvikt.

2: **Simvastatin** – sänker kolesterolhalten i blodet.

2: **Prednisolon** – kortisonpreparat mot inflammation/reumatiska besvär/tumörbehandling etc.

2: **Sendoxan** – cancermedicin.

2: **Paklitaxel** – behandling av cancer.

2: **Diklofenak** – lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber.

1: Heparin, Innohep, Actilyse, Metalyse (I Powder), Multaq, Amlodipin actavis, Pravastatin, Roaccutan, Spektramox, F ortum, Klacid, Dalacin, Ciprofloxacin mylan, Furadantin, Flukonazol mylan, Tibinide, Myambutol, Kivexa, Isentress, Holoxan, Alimta, Vidaza, Oncovin, Etoposid ebewe, Paclitaxel accord, Doxorubicin, Carboplatin accord, Mabthera, Herceptin, Avastin, Tarceva, Sutent, Amekrin (concentrate (I)), Amsakrin, Pegasys, Remicade, Sandimmun, Azatioprin (prod. ospec), Ibumetin, Naproxen, Mivacron, Tramadol, Magnecyl, Pamol, Tegretol, Lyrica, Laponex, Zyprexa velotab, Atarax, Klomipramin, Citalopram.